

場の理論 I レポート問題 第三回

担当：山口哲

2010年7月8日出題、7月30日午後5時締切

問題 1

複素スカラー場 $\phi(x)$ を考える。すなわち、 $\phi(x)$ とその複素共役 $\bar{\phi}(x)$ は二つの実スカラー場 $\phi_1(x), \phi_2(x)$ を使って

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1(x) + i\phi_2(x)), \quad (1)$$

$$\bar{\phi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1(x) - i\phi_2(x)) \quad (2)$$

と書かれている。次のような作用を考える。

$$S = \int d^4x \left[\partial_\mu \bar{\phi} \partial^\mu \phi - m^2 \bar{\phi} \phi - \frac{\lambda}{4} \bar{\phi}^2 \phi^2 \right], \quad (3)$$

$$S_0 = \int d^4x \left[\partial_\mu \bar{\phi} \partial^\mu \phi - m^2 \bar{\phi} \phi \right]. \quad (4)$$

S および S_0 から定義される期待値を、それぞれ $\langle \rangle$ 、 $\langle \rangle_0$ とする。

1. $\delta_\epsilon \phi = i\epsilon \phi$ が S の対称性であることを示せ。
2. この対称性のカレントと電荷を求めよ。
3. $K \neq L$ のとき、 $\langle \phi(x_1) \dots \phi(x_K) \bar{\phi}(y_1) \dots \bar{\phi}(y_L) \rangle = 0$ であることを、対称性を用いて示せ。
4. Fourier 変換

$$\phi(x) = \int_p \rho(p) e^{ip \cdot x}, \quad \bar{\phi}(x) = \int_p \bar{\rho}(p) e^{-ip \cdot x} \quad (5)$$

を考える。ただし、 $\int_p = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}$ である。また、 $\bar{\phi}$ が ϕ の複素共役であることから $\bar{\rho}(p)$ は $\rho(p)$ の複素共役である。 S_0 および S を $\rho, \bar{\rho}$ を用いて表せ。


5. 2点関数、 $\langle \rho(p) \bar{\rho}(q) \rangle_0$ を求めよ。
6. 4点関数 $\langle \rho(p) \rho(q) \bar{\rho}(r) \bar{\rho}(s) \rangle_0$ を求めよ。

7. 摂動論をやるために次のような矢印付きの線をふくむ Feynman diagram を考える。


$$\langle \rho(p) \bar{\rho}(q) \rangle_0 = \overline{\rho \longrightarrow q}$$

Feynman rule で頂点にはどのような種類があるか？

8. 次の真空泡 diagram の対称因子を求めよ。



9. 2点関数の1ループの補正、つまり次の diagram を1つの積分を含む式で書き表せ。さらに、適当な正則化を用いて積分を計算し、実際発散することを確認せよ。



参考

提出は授業の際、あるいはH棟H728室の山口まで提出すること。問題等は以下のページにも置いておく。

<http://www-het.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~yamaguch/j/class.html>